



Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ et on définit $u_n = H_n - \ln n$. On rappelle que la suite u converge vers un réel γ appelé constante d'Euler. On s'intéresse dans ce problème à la rapidité de convergence de u vers γ .

1. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{k+1} \leq \ln \frac{k+1}{k} \leq \frac{1}{k}$.

2. Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

a) Étudier pour tout réel x de l'intervalle $[k, k+1]$ le signe de la fonction f_k définie par

$$f_k(x) = \frac{1}{k} + \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}\right) \cdot (x - k) - \frac{1}{x}.$$

b) En déduire l'encadrement

$$\frac{1}{k+1} \leq \ln \frac{k+1}{k} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k+1} + \frac{1}{k} \right).$$

3. Montrer que $\frac{1}{2} \leq \gamma \leq 1$.

4. Pour tout $x \in]0, +\infty[$, on définit les quantités

$$g_1(x) = -\frac{1}{x+1} + \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{2x^2},$$

$$g_2(x) = g_1(x) + \frac{2}{3x^3}.$$

a) Étudier les variations de g_1 et g_2 puis en déduire leur signe.

b) En déduire que pour tout $n \geq 1$,

$$\frac{1}{2n^2} - \frac{2}{3n^3} \leq u_n - u_{n+1} \leq \frac{1}{2n^2}.$$

5. Remarquons que pour tout entier naturel non nul k et pour tout $x \in [k, k+1]$,

$$\frac{1}{(k+1)^2} \leq \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{k^2},$$
$$\frac{1}{(k+1)^3} \leq \frac{1}{x^3} \leq \frac{1}{k^3}.$$

Pour tout $n \geq 1$, on définit $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ et $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3}$.

a) Montrer que les suites S et T sont convergentes vers deux réels α et β .

b) Pour tout $n \geq 2$, montrer que $\alpha - S_{n-1} \in \left[\frac{1}{n}, \frac{1}{n-1}\right]$ et $\beta - T_{n-1} \leq \frac{1}{2(n-1)^2}$.

6. En déduire que pour tout $n \geq 2$,

$$\frac{1}{2n} - \frac{1}{3(n-1)^2} \leq u_n - \gamma \leq \frac{1}{2(n-1)}.$$

7. Donner une valeur de l'entier n qui permette, à partir de la suite u , de déterminer γ à 10^{-2} près. En déduire un encadrement de γ à 10^{-2} près.