



Exercice 1. (Calculs de Produits) Dans cet exercice, on évitera les raisonnements par récurrence.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, exprimer le produit $\prod_{k=1}^n (2k - 1)$ sous forme de factorielles.

2. Soit $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par récurrence par $nW_n = (n - 1)W_{n-2}$, $n \geq 2$, $W_0 = \frac{\pi}{2}$ et $W_1 = 1$. Pour tout entier naturel n , donner l'expression de W_{2n} et de W_{2n+1} sous forme de factorielles.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, calculer l'expression

$$\sum_{k=1}^n \prod_{j=1}^k \frac{n - j + 1}{j}.$$

4. Soit $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$. Calculer l'expression

$$\sum_{i=1}^n \left(\prod_{j=0}^{p-1} (i + j) \right).$$

Définition (Sommes doubles). Soient I, J deux sous-ensembles finis de \mathbb{N} et $(z_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ une famille de nombres complexes indexée par I et J . La somme des nombres complexes $z_{i,j}$ pour i parcourant l'ensemble I et j parcourant l'ensemble J , est notée

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} z_{i,j} = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} z_{i,j} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} z_{i,j}.$$

Exemples. Soient $m, n \in \mathbb{N}$ tels que $m \leq n$. On suppose que $I = \llbracket 1, n \rrbracket$ et $J = \llbracket 1, m \rrbracket$.

* On note alors

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} z_{i,j} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m z_{i,j} = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n z_{i,j}.$$

En écrivant les $(z_{i,j})_{i \in I, j \in J}$ dans un tableau,

$$\begin{pmatrix} z_{1,1} & z_{1,2} & \cdots & z_{1,m} \\ z_{2,1} & z_{2,2} & \cdots & z_{2,m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n,1} & z_{n,2} & \cdots & z_{n,m} \end{pmatrix}$$

la première somme correspond à la somme des termes du tableau. Dans la deuxième somme, on somme dans un premiers temps chacune des colonnes pour ensuite sommer chacun des résultats obtenus. Dans la troisième somme, on somme dans un premier temps chacune des lignes pour ensuite sommer chaun des résultats obtenus.

* Parfois, dans des sommes doubles, les bornes de la seconde somme dépendent du paramètre de sommation de la première. Par exemple,

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} z_{i,j} = \sum_{j=2}^n \sum_{i=1}^{j-1} z_{i,j} = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n z_{i,j}.$$

En écrivant les $(z_{i,j})_{i \in I, j \in J}$ dans un tableau, on somme dans les trois expressions les complexes

$$\begin{pmatrix} \times & z_{12} & \cdots & z_{1n} \\ & \times & \cdots & z_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \times \end{pmatrix}$$

Exercice 2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer les sommes suivantes. On donnera le résultat sous forme factorisée.

$$1. S_1 = \left(\sum_{i=1}^n i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n j \right).$$

$$3. S_3 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} ij.$$

$$5. S_5 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \min(i, j).$$

$$2. S_2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i \cdot j.$$

$$4. S_4 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} ij.$$

$$6. S_6 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \min(i, j).$$

Pour tous entiers i, j , on note $\delta_{i,j}$ l'entier qui vaut 1 si $i = j$ et 0 sinon (ce symbole est appelé symbole de Kronecker). Calculer

$$7. S_7 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} i \cdot j \cdot \delta_{i,j}.$$

Exercice 3. Soient $n, m \in \mathbb{N}$ et $(a_i)_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$, $(b_j)_{j \in \llbracket 0, m \rrbracket}$ deux familles de nombres complexes. Montrer qu'il existe une famille de nombres complexes $(c_\ell)_{\ell \in \llbracket 0, n+m \rrbracket}$ que l'on explicitera (en fonction des (a_i) et (b_i)) telle que

$$\left(\sum_{i=0}^n a_i X^i \right) \cdot \left(\sum_{i=0}^m b_i X^i \right) = \sum_{\ell=0}^{n+m} c_\ell X^\ell.$$