

* * *

Rédigez le Problème I et le Problème II sur deux copies différentes.
Le lundi 03 avril, précisez le Problème que vous souhaitez revoir corrigé en premier.
Lors de l'épreuve, l'emploi des calculatrices était interdit.

* * *

Problème I : Algèbre et Géométrie

A. Étude de deux applications

La notation $\mathbb{R}_2[X]$ désigne le \mathbb{R} -espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à 2. On identifiera dans la suite de ce problème les éléments de $\mathbb{R}_2[X]$ et leurs fonctions polynomiales associées. On note $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$ la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$. On définit les deux applications suivantes

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_2[X] &\rightarrow \mathbb{R}_2[X] & \text{et } \varphi : \mathbb{R}_2[X] &\rightarrow \mathbb{R} \\ P &\mapsto \frac{1}{2} \left[P\left(\frac{X}{2}\right) + P\left(\frac{X+1}{2}\right) \right] & P &\mapsto P(1) \end{aligned}$$

On rappelle aussi que l'on note $f^0 = \text{Id}_{\mathbb{R}_2[X]}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f^n = f \circ f^{n-1}$.

1. Vérifier que f est bien à valeurs dans $\mathbb{R}_2[X]$ et montrer que f est linéaire.
2. Montrer que φ est linéaire.
3. Écrire la matrice de f dans la base \mathcal{B} de $\mathbb{R}_2[X]$, en indiquant les calculs intermédiaires.
4. L'application f est-elle injective ? surjective ?
5. Déterminer une base de $\text{Ker } \varphi$. Quelle est la dimension de $\text{Ker } \varphi$?
6. L'application φ est-elle injective ? surjective ?

B. Calcul des puissances successives d'une matrice

On note I_3 la matrice identité de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et A la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

Enfin, on note \mathcal{B}' la famille de $\mathbb{R}_2[X]$ définie par $\mathcal{B}' = (1, -2X + 1, 6X^2 - 6X + 1)$.

7. Justifier que la famille \mathcal{B}' est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
8. Écrire la matrice de passage Q de \mathcal{B} à \mathcal{B}' .
9. Justifier que Q est inversible et calculer son inverse.
10. Écrire la matrice M de f dans la base \mathcal{B}' en donnant les calculs intermédiaires.
11. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$. On explicitera les neuf coefficients de A^n .
12. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $P = a + bX + cX^2$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, déterminer $f^n(P)$ en fonction de a, b, c .
13. En déduire que

$$\forall P \in \mathbb{R}_2[X], \forall n \in \mathbb{N}^*, \lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi(f^n(P)) = \int_0^1 P(t) dt.$$

C. Une autre preuve du résultat précédent.

14. À l'aide d'un raisonnement par récurrence, démontrer que

$$\forall P \in \mathbb{R}_2[X], \forall n \in \mathbb{N}^*, f^n(P) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} P\left(\frac{X+k}{2^n}\right).$$

15. En déduire, en utilisant un résultat du cours d'analyse que l'on énoncera avec précision, que

$$\forall P \in \mathbb{R}_2[X], \lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi(f^n(P)) = \int_0^1 P(t) dt.$$

D. Étude d'une famille de sphères et d'une famille de droites.

L'espace affine usuel est rapporté à un repère orthonormé direct $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Les différentes équations qui apparaissent dans la partie **D.** sont relatives au repère \mathcal{R} . Pour tout m réel, on considère l'ensemble S_m d'équation cartésienne

$$S_m : x^2 + y^2 + z^2 - 2mz\sqrt{2} + m^2 - 2 = 0.$$

On appelle aussi \mathcal{E} l'ensemble des points de l'espace vérifiant l'équation

$$\mathcal{E} : x^2 + y^2 = z^2 + 2.$$

On note enfin \mathcal{P} le plan d'équation $y = 0$, c'est-à-dire le plan (xOz) .

16. Montrer que l'intersection de \mathcal{P} et de \mathcal{E} est une conique G , dont on déterminera la nature et les asymptotes éventuelles.

17. Représenter dans le plan \mathcal{P} la conique G .

18. Donner l'excentricité ainsi que les coordonnées du ou des foyer(s) dans le repère \mathcal{R} de la conique G .

19. Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on définit la droite (D_θ) ayant pour système d'équations cartésiennes

$$(D_\theta) : \begin{cases} x - z \cos \theta = \sqrt{2} \sin \theta \\ y - z \sin \theta = -\sqrt{2} \cos \theta. \end{cases}$$

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, déterminer un point et un vecteur directeur de la droite (D_θ) .

On choisira un vecteur directeur dont la troisième coordonnée est égale à 1.

20. Soient θ et m deux réels quelconques. Prouver que la droite (D_θ) est tangente à la sphère S_m .

21. Montrer que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, la droite (D_θ) est incluse dans \mathcal{E} .

22. Réciproquement, montrer que si M est un point de l'ensemble \mathcal{E} de coordonnées (x, y, z) dans le repère \mathcal{R} , alors il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que M appartienne à la droite (D_θ) .

23. Que peut-on déduire des deux questions précédentes ?

Problème II : Analyse

Dans tout ce problème, on notera sh la fonction sinus hyperbolique, ch la fonction cosinus hyperbolique et th la fonction tangente hyperbolique.

A. Étude d'une fonction

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R}^* par $f(x) = x \operatorname{sh}\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Étudier la parité de f .

2. a) Rappeler un équivalent de la fonction sh en 0 et en déduire les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

b) Déterminer la limite de f en 0.

3. Justifier que f est dérivable sur \mathbb{R}^* et que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f'(x) = \left[\operatorname{th}\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} \right] \times \operatorname{ch}\left(\frac{1}{x}\right).$$

4. Montrer que, pour tout $X \in \mathbb{R}_+^*$, $\text{th}(X) < X$.
5. En déduire le tableau de variations de f .
6. Donner le développement limité à l'ordre 4 en 0 de la fonction $X \mapsto \frac{\text{sh}X}{X}$.
7. En déduire qu'au voisinage de $+\infty$ et de $-\infty$, f admet un développement de la forme

$$f(x) = a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \frac{a_3}{x^3} + \frac{a_4}{x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right),$$

où a_0, \dots, a_4 sont cinq réels que l'on précisera.

8. Montrer que la fonction $x \in \mathbb{R}^* \mapsto f\left(\frac{1}{x}\right) \in \mathbb{R}$ se prolonge sur \mathbb{R} en une fonction continue notée F , puis prouver que F est dérivable sur \mathbb{R} .

B. Tracé d'une courbe paramétrée

On s'intéresse à l'arc paramétré défini pour $t \neq 0$ par les équations

$$\begin{cases} x(t) = t \text{sh}\left(\frac{1}{t}\right) \\ y(t) = t \exp\left(\frac{1}{t}\right). \end{cases}$$

On note Γ son support. On donne la valeur approchée $\text{sh}(1) \approx 1,18$ à 10^{-2} près.

9. Dresser le tableau des variations des fonctions x et y sur \mathbb{R}^* , en précisant les limites.
10. Déterminer les asymptotes de Γ et préciser la position de Γ par rapport à chacune de ces asymptotes.
On résumera l'étude à l'aide de schémas.

11. Tracer l'allure de Γ , ainsi que ses asymptotes et la tangente à Γ au point M de paramètre $t = 1$. On prendra 2 cm comme unité en abscisses et en ordonnées.

C. Une équation différentielle

On considère l'équation différentielle (E) suivante, que l'on va résoudre sur différents intervalles

$$(E) : xy' + y = \text{ch}(x).$$

12. Résoudre sur l'intervalle \mathbb{R}_+^* l'équation différentielle (E).
13. Donner sans justification les solutions de l'équation différentielle (E) sur l'intervalle \mathbb{R}_-^* .
14. Justifier que la fonction F (définie dans la question A.8) est l'unique fonction définie et dérivable sur \mathbb{R} qui soit solution de l'équation différentielle (E) sur \mathbb{R} .

D. Étude d'une suite

15. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation

$$f(x) = \frac{n+1}{n}$$

admet une unique solution dans \mathbb{R}_+^* . On la note u_n .

On définit ainsi une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ que l'on va étudier dans les questions qui suivent.

16. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante.
17. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tend vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$.
18. En utilisant la question A.7, déterminer un équivalent de u_n quand n tend vers $+\infty$.

E. Une fonction définie par une intégrale

Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, on pose $J(x) = \int_{x/2}^x f(t) dt$.

19. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{sh}(2x) = 2\text{ch}(x)\text{sh}(x)$.
20. Justifier que J est dérivable sur \mathbb{R}_+^* et que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$J'(x) = f(x) \left[1 - \frac{1}{2} \text{ch}\left(\frac{1}{x}\right) \right].$$

21. En déduire le signe de J' sur \mathbb{R}_+^* ; on exprimera le (ou les) zéro(s) de J' à l'aide de la fonction \ln .

22. On admet les résultats suivants :

* $\lim_{x \rightarrow 0^+} J(x) = +\infty$,

* $\lim_{x \rightarrow +\infty} J(x) = +\infty$ et J admet au voisinage de $+\infty$ une asymptote d'équation $y = \frac{x}{2}$,

* la courbe représentative de J est toujours au-dessus de l'asymptote précédente.

Donner le tableau de variations de J sur \mathbb{R}_+^* .

23. Tracer l'allure de la courbe représentative de J .

On donne pour le tracé : $\frac{1}{\ln(2+\sqrt{3})} \approx 0,76$ et $J\left(\frac{1}{\ln(2+\sqrt{3})}\right) \approx 0,65$ à 10^{-2} près.